



รายงานผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรื่อง

การแยกprotoplast ของมันฝรั่งเพื่อศึกษาความสามารถ
ในการสร้างแคลลิไล

PROTOPLAST ISOLATION OF POTATO TO STUDY
CALLI REGENERATION

โดย

นลินี รุ่งเรืองศรี และ อุทัย รุ่งเรืองศรี



รายงานผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรื่อง การแยกprotoplast ของมันฝรั่งเพื่อศึกษาความสามารถในการสร้างแคลลิล

PROTOPLAST ISOLATION OF POTATO TO STUDY CALLI
REGENERATION

ได้รับการจัดสรรงบประมาณวิจัย ประจำปี 2536

จำนวน 222,000 บาท

หัวหน้าโครงการ นางนลินี รุ่งเรืองศรี
ผู้ร่วมโครงการ นายอุทัย รุ่งเรืองศรี



คำนิยม
(Acknowledgement)

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2536 การดำเนินงานวิจัยเป็นไปด้วยความล่าช้า
เนื่องจากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในห้องทดลองแต่ได้รับความอนุเคราะห์จากรองศาสตราจารย์
ดร. ขันนท์ เที่ยงตรง ที่ได้ออนุญาตให้ใช้ห้องปฏิบัติการของคุณย์เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ในช่วงหลังของการดำเนินงานวิจัยจนได้ข้อมูลมาเสนอเป็นรายงานฉบับนี้ คณะผู้วิจัยจึง
ขอขอบพระคุณยิ่ง



บทคัดย่อ	1
Abstract	1
คำนำ	2
อุปกรณ์และวิธีการ	3
ผลการวิจัย	14
วิจารณ์ผล	22
เอกสารอ้างอิง	24



หน้า

ตารางที่ 1	สูตรอาหาร modified Murashige and Skoog สำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันฝรั่ง	5
ตารางที่ 2	สูตรเตรียม Shepard's float solution	8
ตารางที่ 3	สูตรเตรียม Shepard's soak solution	8
ตารางที่ 4	สูตรเตรียม stock solution	9
ตารางที่ 5	สูตรเตรียม enzyme solution	10
ตารางที่ 6	สูตรเตรียม Shepard's rinse solution	11
ตารางที่ 7	สูตรเตรียม Shepard's holding solution	11
ตารางที่ 8	สูตรเตรียมอาหาร cell layer (CL)	12
ตารางที่ 9	ผลผลิตโปรตoplastที่แยกได้จาก mesophyll ของมันฝรั่ง ซึ่งผ่านการเพาะเลี้ยงแบบ <i>in vitro</i>	15
ตารางที่ 10	Analysis of Variance ของจำนวนโปรตoplast (\times ล้าน) ต่อน้ำหนักใบสด 1 กรัม จากมันฝรั่ง 7 พันธุ์ที่ได้เพาะเลี้ยงในสภาพ <i>in vitro</i>	18



ภาพที่ 1	protoplast มันฝรั่งที่แยกได้ ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ กำลังขยาย 10×10	18
ภาพที่ 2	protoplast มันฝรั่ง ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ กำลังขยาย 10×40	19
ภาพที่ 3-4	protoplast มันฝรั่งเริ่มแบ่งตัว หลังจากที่เลี้ยงใน CL medium 1-2 วัน	20
ภาพที่ 5, 6, 7	protoplast มันฝรั่ง มีการแบ่งตัวเป็นกลุ่มเซลล์ หลังจากที่เพาะเลี้ยง ใน CL medium ประมาณ 1 สัปดาห์	20
ภาพที่ 8	Microcalli ที่เกิดจากการเพาะเลี้ยง protoplast มันฝรั่งซึ่งแยกจาก mesophyll ของต้นที่เจริญในสภาพ <i>in vitro</i> ภาพจากกล้อง stereoscope กำลังขยายต่ำ	21
ภาพที่ 9-10	Microcalli จาก protoplast มันฝรั่ง อายุประมาณ 4 สัปดาห์ เลี้ยงใน อาหารสูตร cell layer ภาพจากกล้อง stereoscope กำลังขยายสูง	21



การแยกโปรตอพลาสท์ของมันฝรั่งเพื่อศึกษาความสามารถ ในการสร้างแคลลิ

PROTOPLAST ISOLATION OF POTATO TO STUDY CALLI REGENERATION

นายนิ รุ่งเรืองศรี

ภาควิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ฤทธิ์ รุ่งเรืองศรี

ภาควิชาอาชีวศึกษาพืช

คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บทคัดย่อ

การเพาะเลี้ยงโปรตอพลาสท์พืชจนเป็นแคลลิแล้วซักนำไปเจริญเป็นต้นพืชนั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่อาจจะเป็นประโยชน์แก่งานปรับปรุงพันธุ์ โดยเฉพาะการคัดเลือกพันธุ์ด้านทานโครค งานวิจัยนี้เป็นงานทดลองแยกโปรตอพลาสท์จาก mesophyll ของมันฝรั่ง 7 พันธุ์ โดยใช้ส่วนใบจากต้นที่ได้เลี้ยงในสภาพ *in vitro* แล้ว 1 เดือน แล้วจึงสังเกตความสามารถในการสร้าง microcalli ซึ่งเป็นสภาพแรกก่อนที่จะ regenerate เป็นต้นพืช ผลการศึกษาแสดงว่าใบของมันฝรั่งทั้ง 7 พันธุ์แยกเป็นโปรตอพลาสท์ได้ในปริมาณเพียงพอแก่การนำไปเพาะเลี้ยงต่อเป็น microcalli ปัจจุบันในภูมิภาคด้านการเพาะปลูกมันฝรั่งที่สำคัญที่สุดคือการป้องกันจากเชื้อราและแมลงศัตรูพืช แต่การเพาะเลี้ยงต่อไปในระยะยาวจะต้องมีวิธีการที่สามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแมลงศัตรูพืชได้ ดังนั้น การศึกษาความสามารถในการสร้างแคลลิของมันฝรั่งทั้ง 7 พันธุ์นี้จึงมีความสำคัญอย่างมาก

Abstract

Protoplast cultures for plant regeneration is a novel method for crop improvement, especially for disease resistance. Protoplasts were isolated from leaf mesophylls of seven potato cultivars which had been grown under *in vitro* conditions. Protoplast cultures were initiated to determine the ability to form microcalli of all seven



cultivars. Results showed that protoplast yields were all satisfactory and could be used for microcalli generation under another medium. This initial experience indicates that the *in vitro* working environment must be strictly regulated to prevent contamination if more extensive research on protoplasts is desired.

คำนำ (Introduction)

มันฝรั่ง (*Solanum tuberosum L.*) เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญและมีการปลูกอย่างแพร่หลาย แต่เนื่องจากมันฝรั่งมีความอ่อนแอต่อโรคหลายอย่าง ผลผลิตแต่ละปีมักจะถูกทำลายด้วยโรคต่างๆ การป้องปุ่นด้วยวิธีผสมพันธุ์ยังใช้เวลานานและไม่นำไปสู่ความต้านทานโรคที่สำคัญได้เสมอไป นอกจากนี้ยังเป็นภาระที่จะหาลักษณะต้านทานโรคที่แท้จริงมาผสมกับพันธุ์ปลูกซึ่งมีลักษณะพึงประสงค์อื่นๆ การขยายพันธุ์โดยวิธีเพาะเลี้ยงในปรอตพลาสท์ เป็นวิธีการที่ให้ปรอตพลาสท์เดียวแบ่งตัวเป็นแคลลิ (calli) ซึ่งจะสามารถเจริญเป็นต้นพืช ในวิธีการนี้อาจจะพบต้นพืชที่ได้กลายพันธุ์ (soma clonal variation) และเกิดลักษณะต้านทานโรคได้

โรคใบไหม้ (late blight) นำโดยเชื้อรา *Phytophthora infestans* (Mont.) de Bary มีส่วนสำคัญในการลดปริมาณผลผลิตของมันฝรั่ง เชื้อรากวนนี้ก่อโรคโดยเข้าทำลายส่วนใบ และหัวของพืช การศึกษาความต้านทานโรคใบไหม้ในมันฝรั่งโดยใช้ปรอตพลาสทนั้นได้มีผู้ริเริ่มนานแล้ว (Behneke, 1979, 1980; Shepard, et al, 1980, 1981; Tomiyama, et al, 1974)

ข้อมูลจากการทดลองด้านป้องปุ่นด้วยแปลงได้ระบุว่ามีความต้านทานโรคใบไหม้นี้ 2 ชนิด ได้แก่ ความต้านทานอย่างจำเพาะซึ่งนำโดย major genes (R genes) ซึ่ดหนึ่งและก่อให้เกิดปฏิกิริยาในพืชที่เรียกว่า hypersensitivity กับอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า general หรือ field resistance ซึ่งควบคุมโดย minor genes (Toxopeus, 1964) ความต้านทานซึ่งนำโดย major genes นั้นจะเป็นรองต่อบรรเชื้อรา *P. infestans* เพราะจะเกิด races ในมี ๆ ซึ่ง(Gallegly, 1968) แต่ความต้านทานอีกชนิดหนึ่งซึ่งอาจจัดว่าเป็นลักษณะเชิงปริมาณ (quantitative character) นั้น นิยามเพียงลดระดับการเข้าทำลายพืชและคุ้มกันพืชจากเชื้อราทุก race (ความรุนแรงของโรคลด

น้อยลง) เนื่องจากผลจากการศึกษาในแปลงได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับลักษณะด้านท่านโครคไปใหม่ว่า มีการแสดงออก (expression) ที่แตกต่างกันเป็นสองชนิด การศึกษาในระดับเซลล์หรือproto พลัสท์ของมันฝรั่งอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับกลไกด้านท่านโครคของเซลล์เจ้าบ้าน

การศึกษาเบื้องต้นครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะแยกไปรโ托พลาสท์จากmesophyllของมันฝรั่งพันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งได้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และศึกษาความสามารถในการสร้างแคลลิโดยของพันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งความสามารถในการสร้างแคลลิในเป็นขั้นตอนแรกในregenerationเป็นต้นพืช หากวิธีการในการศึกษาครั้งนี้ได้ผลดีก็จะสามารถนำไปรโ托พลาสท์หรือแคลลิไปใช้งานได้เกิดความต้านทานโรคและอาจนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องปุ่งพันธุ์โดยวิธีการใหม่ ๆ

ឧបករណ៍នៃវិធីការ (Materials and Methods)

1. พั้นธุ์มันฝรั่ง

มันฝรั่งที่ทำการเพาะเลี้ยงมีพันธุกรรมต่างกันซึ่งบางพันธุ์ได้รับการจำแนกตามคุณภาพความด้านงานโภคใบในมีจากเชื้อรา *Phytophthora infestans* ดังนี้

ชื่อพันธุ์	ยืนต้านทานโรคใบในมี
B6086 WV 21	R ₁ R ₂ R ₃
Kennebec	R ₁
Russet Burbank	r (ไม่ต้านทาน)
Bintje	r (ไม่ต้านทาน)
Pentland Ace	ไม่ทราบ
Norkotah	ไม่ทราบ
Banana	ไม่ทราบ

2. การเพาะเลี้ยงมันฝรั่ง

การเตรียมวัสดุพืชเพื่อการแยกโปรดิพลาสท์จำเป็นต้องมีสภาพปลอดเชื้อ เริ่มจากตัดเนื้อนหน่อที่แตกจากหัวพันธุ์ แล้วตัดเป็นชิ้นยาว 1-2 ซม. นำไปล้างน้ำให้สะอาด 20 นาที ตามด้วยการแช่ในสารคลอราย 0.5 % sodium hypochlorite + Tween 20 เป็นเวลา 5 นาที แล้วจุ่มใน 0.5 % sodium hypochlorite 3 นาที แช่ล้างในน้ำกลันที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 3 ครั้ง ๆ ละ 15 นาที นำไปต่ำง shoot tip ไปเลี้ยงในอาหาร modified MS 15 มล. ในหลอดแก้วขนาด 25x150 มม. หลังจากนั้นทำการ subculture ทุกเดือนหรือทุก 6 สัปดาห์ตามความจำเป็นและความพร้อม

ในการขยายพันธุ์ต้นมันฝรั่งในสภาพ *in vitro* ใช้ส่วนยอดหรือตาตามข้อลำต้น ตัดยาวประมาณ 1-2 ซม. เลี้ยงในขวดปากกว้างเส้นผ่าศูนย์กลาง 9.0 ซม. สูง 15.5 ซม. ซึ่งมีอาหารเลี้ยง mMS บรรจุอยู่ราว 80 มล. และปิดด้วยจานล่างของ petri dish ขนาดมาตรฐานโดยมีแผ่นพลาสติกใสพันรอบอีกที เมื่อเพาะเลี้ยงมันฝรั่งแต่ละพันธุ์ได้ดีแล้วจึงเก็บส่วนใบเพื่อการแยกโปรดิพลาสท์ หากมีการเจริญปูนของเชื้อราจะต้องนำเชื้อและย้ายปลูกในขวดใหม่จนได้พืชที่ปลอดเชื้อ

การเพาะเลี้ยงมันฝรั่งแบบ *in vitro* ต้องควบคุมสภาพแวดล้อม พืชได้แสงจากหลอดไฟชนิด cool white fluorescent 40 วัตต์ และหลอดไฟชนิด Grolux 40 วัตต์ หลอดไฟทั้งสองชนิดติดอยู่ที่ข้างวงขวดเพาะเลี้ยง โดยมีระยะห่างจากขวดเพี้ยงประมาณ 10 ซม. ภายในห้องเพาะเลี้ยงมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 25° ซ.



ตารางที่ 1 สูตรอาหาร modified Murashige and Skoog สำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันผั่ง

ส่วนประกอบ	ปริมาณ (มก./ลิตร)
Ammonium nitrate	1,650.0
Boric Acid	6.2
Calcium chloride .2H ₂ O	880.0
Casein hydrolysate	10.0
Cobalt chloride .6H ₂ O	0.025
Cupric sulfate .5H ₂ O	0.025
Ethylenediaminetetraacetic acid .Na ₂	37.3
Ferrous sulfate 7.H ₂ O	27.8
Gibberellic acid (GA ₃)	0.25
Glycine	2.0
Magnesium sulfate .7H ₂ O	370.0
Manganese sulfate H ₂ O	16.9
Molybdic acid sodium salt .2H ₂ O	0.25
Myo-Inositol	100.0
Nicotinic acid	100.0
Panthenate calcium	2.0
Potassium iodide	0.83
Potassium nitrate	1,900.0
Potassium phosphate monobasic	340.0
Pyridoxine .HCl	0.5
Sucrose	30,000.0
Thiamine .HCl	180.0
Zinc sulfate .7H ₂ O	8.6
Agar	7,500.0
pH 5.8 ปรับด้วย KOH หรือ HCl ใส่ 80 มล.ของส่วนผสมข้างบนในขวดเพาะเลี้ยง	
ปิดด้วยฝา petri dish และจึงนึ่งฆ่าเชื้อ	



3. การแยกโปรตพลาสท์มันฝรั่ง

วิธีการแยกโปรตพลาสท์ใช้น้ำได้ดัดแปลงจาก Shepard และ Tollen (1977), Shepard (1981) และ Haberlach et al (1975)

เมื่อต้มมันฝรั่งมีอายุระหว่าง 4 สัปดาห์เก็บส่วนใบเพื่อนำไปแยกเป็นโปรตพลาสท์ ให้มีดัดแปลงในที่สมบูรณ์ ขั้นตอนนี้นำไปที่ได้จากแต่ละช่วงเพาะเลี้ยง แล้วใส่ลงใน Shepard's float solution (สำหรับ preconditioning) ปริมาณ 100 มล. ในชุดซึ่งมีฝาปิดเป็นเกลียวขนาด 250 มล. ขั้นตอนนี้ใช้เวลา 2 วันในที่มีดัดแปลง 25°C หลังจากนั้นย้ายไปมันฝรั่งลงใน soak solution ทึ้งไว้นาน 1 วันที่ 4°C. (soak solution มีส่วนประกอบเป็น mineral salts ที่ความเข้มข้นเป็น □ เท่าของในสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อยื่น) โดยใช้ flask ขนาด 250 มล. ที่มี evacuation sidearm หลังจากที่แข็งในความเย็นแล้ว ("cold soak") แล้ว รินสารละลายทิ้งแล้วเติม enzyme solution ซึ่งเป็นส่วนผสมของเอนไซม์ 2 ชนิด คือ cellulase กับ pectinase ซึ่งมี sucrose เป็น osmoticum สารละลายเดินไซม์นี้ใช้เติมในอัตรา 25 มล. ต่อกรัมน้ำหนัก ใบสด ขั้นตอนนี้เป็นการนำเอ็นไซม์เข้าสู่เซลล์พืชโดยวิธีสูญญากาศจากภายนอก (infiltration by suction) เป็นเวลาราวๆ หนึ่งนาที จนกระทั่งใบมันฝรั่งเปลี่ยนเป็นสีเขียวแก่ อย่างทั่วถึง แล้วจึงปล่อยให้เกิด enzyme digestion ข้ามคืนบน牉หมุนที่ความเร็ว 45 ร.ต. น. ที่ 25°C จากนั้นกรองน้ำเนื้อยื่นไปลงในชุด babcock ภายใต้สภาพปลอดเชื้อและใช้ membrane filter ขนาด 0.2 ไมครอน เติม Shepard's rinse solution จนถึงคงขวด babcock ที่ขีด 7.5 ปิดขวดด้วยอุณหภูมิเนี่ยมฟอยล์แล้วจึง centrifuge ที่ความเร็ว 500 ร.ต.น. นาน 10 นาที โปรตพลาสท์จาก mesophyll จะลอยตัวขึ้นสู่ด้านบนของชุด babcock ปากกว้างเป็นชั้นโปรตพลาสท์อยู่ที่คอขวด ใช้ pasteur pipet ปลดเชือยฯ 9 นิ้วดูดเอาโปรตพลาสท์ใส่ชุด babcock ใหม่ เติม rinse solution จนถึงคงขวดแล้วจึง centrifuge ใหม่อีกครั้งก่อน เมื่อเสร็จขั้นตอนการแยกโปรตพลาสท์แล้ววัดปริมาตรของชั้นโปรตพลาสท์ นับจำนวนโปรตพลาสท์โดยใช้ hemacytometer แล้วบันทึกผลเป็นจำนวนโปรตพลาสท์ที่แยกได้ต่อน้ำหนักใบ 1 กรัม



เพาะเลี้ยงมันฝรั่งในสูตรอาหาร modified Murashige and Skoog

เก็บใบใส่ในShepard's float solution ในที่มืด เป็นเวลา 2 วัน 25°C

ขยับใบใส่ใน soak solution ในที่มืด เป็นเวลา 1 วัน 4°C

ใส่ในสารละลายนีโหน่ ใช้แรงดูดสูญญากาศจากปั๊มภายนอก

ย่อylexel'sพีซ 16 ซม. บนถ้วยหมุน ความเร็ว 45 รอบต่อนาที

กรองเนื้อเยื่อใบในสภาพ sterile เก็บส่วนที่กรองได้ในขวด babcock
เติม rinse solution จนถึงขีดที่คือขวด

Centrifuge ขวด babcock ความเร็ว 500 รอบต่อนาที 10 นาที

ดูดโปรตอพลาสท์ใส่ขวด babcock ใหม่ เติม rinse solution
แล้ว centrifuge เหลืองเดิมอีก 1 ครั้ง

เก็บโปรตอพลาสท์ด้วย pasteur pipet จากขวด babcock
สังเกตปริมาณที่ได้ หาจำนวนโปรตอพลาสท์โดยใช้ hemacytometer

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการแยกโปรตอพลาสท์จาก mesophyll ของใบมันฝรั่ง



ตารางที่ 2 สูตรเตรียม Shepard's float solution

ส่วนประกอบ	ปริมาณ (มก./ลิตร)
NH_4NO_3 (1 mM)	80.0
$\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (1 mM)	147.0
Naphthalene acetic acid	2.0
Benzylaminopurine	1.0
เวลาเตรียมใช้ 80 มล. ใส่ลงใน screw-capped flask ขนาด 250 มล. นึ่งอบฆ่าเชื้อ 20 นาที	

ตารางที่ 3 สูตรเตรียม Shepard's soak solution

ส่วนประกอบ	ปริมาณ ต่อลิตร
Major salt stock	23.8 มล.
Organics stock	1.2 มล.
BAP stock	0.5 มล.
NAA stock	1.0 มล
pH 5.6 ปรับด้วย KOH หรือ HCl	
เวลาเตรียม นำ 80 มล. ใส่ใน evacuation flask ขนาด 250 มล. ปิดปาก flask ด้วยจุกยาง 夙มท่อยาง 7 ซม.บน sidearm ของ flask (ต้องเป็นชนิดที่ทนความร้อนได้) ใช้สำลีอุดท่อดังกล่าวแล้วจึงนึ่งอบฆ่าเชื้อได้	



ตารางที่ 4 สูตรเตรียม stock solution

ส่วนประกอบ	ปริมาณ (กรัม/ลิตร)
1. Major Salts Stock	
KNO ₃	19.0
CaCl ₂ .2H ₂ O	4.4
MgSO ₄ . 7H ₂ O	3.7
KH ₂ PO ₄	1.7
2. Fe-EDTA Stock	
Na ₂ EDTA	0.373
FeSO ₄ .7H ₂ O	0.278
3. Minor Element Stock I	
H ₃ BO ₄	0.62
MnCl ₂ .4H ₂ O	0.025
CuSO ₄ .7H ₂ O	0.0025
CoSO ₄ .7H ₂ O	0.003
4. Minor Element Stock II	
KI	0.083
Na ₂ MoO ₄ .2H ₂ O	0.025
CuSO ₄ .5H ₂ O	0.0025
CuSO ₄ .7H ₂ O	0.003
5. Organics	
myo-Inositol	20.0
Thiamine .HCl	0.1
Glycine	0.4
Nicotinic acid	1.0



ตารางที่ 4 (ต่อ)

ส่วนประกอบ	ปริมาณ (กรัม/ลิตร)
Pyridoxine .HCl	0.1
Folic acid	0.1
Biotin	0.01
หลังจากเตรียมสารละลายแล้ว เก็บ Minor Element Stock II ไว้ในที่มีด ให้ในเก็บ Organics ไว้ในที่มีดโดยแบ่งแซ่บเป็นน้อย ๆ เก็บสารละลายอีก ให้ที่ 4 °C	

ตารางที่ 5 สูตรเตรียม enzyme solution

ส่วนประกอบ	ปริมาณ ต่อ 100 มล.
Cellulysin, cellulase (Calbiochem) Macerase, pectinase (Calbiochem)	0.5 กรัม 0.1 กรัม
Polyvinylpyrrolidone Mol. Wt 10,000 (PVP-10)	1.0 กรัม
Major salts stock	2.5 มล.
2-(N-Morpholino) ethanesulfonic acid (MES) (0.5 M)	1.0 มล.
Casein hydrolysate	1.0 มล.
Sucrose	10.3 กรัม
pH 5.6 ปรับด้วย KOH หรือ HCl เมื่อเตรียมแล้วกรองให้ปิดอดเชื้อด้วย sterile filter ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรู 0.22 ไมครอน	



ตารางที่ 6 สูตรเตรียม Shepard's rinse solution

ส่วนประกอบ	ปริมาณ
Major salt stock	20.0 มล.
Casein hydrolysate	2.0 มก.
Sucrose	20.5 กรัม
เตรียมปริมาณ 200 มล. ปรับ pH 5.6 ด้วย KOH หรือ HCL กรองให้ปอดเดือดด้วย sterile filter membrane ขนาดรู 0.22 ไมครอน	

4. การเพาะเลี้ยงโปรตอพลาสท์

เพื่อตัวการเจือจางโปรตอพลาสท์ที่แยกได้แล้วโดยใช้ Shepard's holding solution ถึงความหนาแน่น 1 ล้านเซลล์ ต่อ 1 มล. ทึ้งโปรตอพลาสท์ไว้ใน holding solution 1 ชม. เพื่อให้มีการปรับตัวเข้ากับสูตรอาหารใหม่ซึ่งมีเกลือเข้มข้น ต่อจากนั้นจึงใส่โปรตอพลาสท์ลงใน petri dish ที่มีอาหารสูตร CL (cell layer) 15 มล. โดยให้มีจำนวนโปรตอพลาสท์ในอัตรา 2.0×10^4 /มล. เก็บรักษาในเพาะเลี้ยงไว้ในสภาพแวดล้อมเดียวกับการเพาะเลี้ยงต้นมันฝรั่ง คุณลักษณะการเกิด microcalli ซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและกล้อง stereoscope ภายในหลังการเริ่มเพาะเลี้ยง 2 สัปดาห์

ตารางที่ 7 สูตรเตรียม Shepard's holding solution

ส่วนประกอบ	ปริมาณ
$\frac{1}{2}$ ความเข้มข้น major salts ในสูตรอาหาร CL	
Fe, EDTA, และ minor elements ในสูตรอาหาร CL	
Casein hydrolysate	1.0 กรัม
Sucrose	0.5 M
Xylitol, D-mannitol, myo-inositol, และ sorbitol	0.025 M
ปรับ pH 5.6 แล้วกรองให้ปอดเดือด	



ตารางที่ 8 สูตรเตรียมอาหาร cell layer (CL)

ส่วนประกอบ	ปริมาณ มิลลิกรัม/ลิตร
Major Salts	
KNO ₃	7,600
CaCl ₂ .H ₂ O	1,700
MgSO ₄ .7H ₂ O	1,400
KH ₂ PO ₄	680
Iron และ Minor Salts	
Na ₂ .EDTA	18.5
FeSO ₄ .7H ₂ O	13.9
H ₃ BO ₃	3.1
MnCl ₂ .4H ₂ O	9.9
ZnSO ₄ .7H ₂ O	4.6
KI	0.42
Na ₂ MoO ₄ .2H ₂ O	0.13
CuSO ₄ .5H ₂ O	0.013
CoSO ₄ .7H ₂ O	0.015
Organics	
Thiamine hydrochloride	0.5
Glycine	2.0
Nicotinic acid	5.0
Pyridoxine hydrochloride	0.5
Folic acid	0.5
Biotin	0.05
Casein hydrolysate	50.0



ตารางที่ 8 (ต่อ)

ส่วนประกอบ	ปริมาณ มิลลิกรัม/ลิตร
Plant Hormones	
1-Naphthalene acetic acid	1.0
6-Benzylaminopurine	0.4
Osmoticum	
Sucrose	0.200 M
Myo-Inositol	0.025 M
D-Mannitol	0.025 M
Sorbitol	0.025 M
Xylitol	0.025 M
Agarose 0.45 % (Sigma Type VII)	
PH 5.6	
เวลาเตรียมนำสารละลายที่มีส่วนประกอบต่างๆ กองให้ปัล卓เชือก่อน แล้วจึงผสมรวมกับ agarose ที่หลอมไว้แล้ว	



ผลการวิจัย

(Results)

1. การเพาะเลี้ยงในสภาวะ *in vitro* และคุณภาพของใบมันฝรั่งที่ใช้

การเพาะเลี้ยงมันฝรั่งในอาหาร modified Murashige and Skoog (mMS) ภายใต้สภาวะ *in vitro* ซึ่งมีการควบคุมแสงและอุณหภูมิให้ผลเป็นที่น่าพอใจ เมื่อมีปัญหาเป็นปัจจัยในบางครั้งก็แก้ไขได้ แต่ทำให้เสียเวลาเนื่องจากไม่สามารถทำการแยกไปร์โตพลาสท์ได้พร้อมกันทุกพันธุ์ เมื่อต้นมันฝรั่งมีอายุประมาณ 4 สัปดาห์ก็ทยอยเก็บใบเพื่อแยกไปร์โตพลาสท์

ใบของมันฝรั่งที่ได้จากการเพาะเลี้ยงแบบ *in vitro* มีขนาดใบเล็กกว่าที่ปลูกในแปลงมาก ใบของมันฝรั่งทั้ง 7 พันธุ์ใช้แยกไปร์โตพลาสท์ได้ดีเมื่อก่อนกัน เมื่อผ่านวิธีการแยกไปร์โตพลาสท์ไม่พบว่าเกิดสีน้ำตาล (browning) ในขั้นตอนลดลง ซึ่งคงเป็นข้อแตกต่างจากมันฝรั่งที่ปลูกในแปลงหรือเรือนกระจก

2. การแยกไปร์โตพลาสท์

การทดลองครั้งนี้สามารถแยกไปร์โตพลาสท์จาก mesophyll ของมันฝรั่งได้ทั้งหมดรวม 7 พันธุ์ โดยวิธีการที่ดัดแปลงจาก Shepard และ Totten (1977), Shepard (1981) และ Haberlach et al (1975) และเนื้อเยื่อใบที่ใช้นั้นได้มาจากการเพาะเลี้ยงต้นมันฝรั่งแบบ *in vitro* ที่มีอายุประมาณ 1 เดือน ตารางต่อไปนี้แสดงผลที่ได้จากใบมันฝรั่งสดที่มีน้ำหนักตั้งแต่ประมาณ 0.3 – 1.0 กรัม



ตารางที่ 9 ผลผลิตโปรตีพลาสท์ที่แยกได้จาก mesophyll ของมันฝรั่งซึ่งผ่านการเผาเลี้ยงแบบ *in vitro*

in vitro

พันธุ์มันฝรั่ง	น้ำหนักใบสด (กรัม)	จำนวนโปรตีพลาสท์ที่ได้ (x ล้าน)	จำนวนโปรตีพลาสท์ (x ล้าน)
			ต่อน้ำหนักใบ 1 กรัม
Kennebec	0.450	1.728	3.840
	0.650	4.704	6.579
	0.591	2.100	3.553
	0.709	4.425	6.241
	0.881	1.900	2.157
	0.958	5.850	6.106
	0.600	10.400	17.333
	0.900	12.000	13.333
	0.755	4.725	6.258
	0.500	2.850	5.700
	0.570	1.047	1.837
	0.517	1.256	2.429
	0.383	5.375	14.034
B6080 WV21			ค่าเฉลี่ย <u>6.108</u>
	0.858	10.800	12.587
	0.658	3.075	4.673
	0.581	5.025	6.368
	0.427	3.700	11.768
	0.366	4.600	12.568
	0.840	9.900	11.786
	0.905	6.750	7.459
	0.612	4.977	8.132
	0.648	3.441	5.310
	0.467	1.415	3.030



ตารางที่ 9 (ต่อ)

พันธุ์มันฝรั่ง	น้ำหนักใบสด (กรัม)	จำนวนโปรตีเพลาสท์ที่ได้ (x ล้าน)	จำนวนโปรตีเพลาสท์ (x ล้าน) ต่อน้ำหนักใบ 1 กรัม
Pentland Ace	0.317	1.145	3.612
	0.848	0.954	1.125
	0.980	2.250	2.300
			ค่าเฉลี่ย <u>6.978</u>
	0.599	6.120	10.217
	0.535	2.650	4.953
	0.686	2.350	3.426
	0.631	3.690	5.849
	0.610	4.275	7.008
	0.873	5.500	6.300
	0.490	4.336	8.849
	0.437	0.640	1.465
Banana	0.359	1.388	3.866
	0.401	1.382	3.446
	0.440	1.890	4.296
	0.900	2.400	2.661
			ค่าเฉลี่ย <u>5.195</u>
	0.645	10.125	15.698
	0.357	3.300	9.244
	0.600	3.000	5.000
	0.749	5.200	6.943
			ค่าเฉลี่ย <u>9.221</u>



ตารางที่ 9 (ต่อ)


พันธุ์มันฝรั่ง	น้ำหนักใบสด (กรัม)	จำนวนโปรตีพลาสท์ที่ได้ (x ล้าน)	จำนวนโปรตีพลาสท์ (x ล้าน) ต่อน้ำหนักใบ 1 กรัม
Bintje	0.627	6.000	9.569
	0.768	3.750	4.883
	0.900	9.000	10.000
	0.500	4.500	9.000
	0.580	12.125	20.905
	0.600	3.086	5.143
Russet Burbank			ค่าเฉลี่ย <u>9.917</u>
	0.740	3.675	4.966
	0.300	1.237	4.137
	0.320	1.456	4.550
	0.330	0.990	3.000
Norkotah			ค่าเฉลี่ย <u>4.163</u>
	0.295	1.976	6.698
	0.540	1.450	2.685
	0.480	1.760	3.672
			ค่าเฉลี่ย <u>4.352</u>

การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนโปรตีพลาสท์ (x ล้าน) ต่อน้ำหนักใบสด 1 กรัมทางสถิติได้
ทำการวิเคราะห์ analysis of variance โดยใช้โปรแกรม Statistical Analysis System (SAS) ผลการวิเคราะห์
ไม่แสดงความแตกต่างในปริมาณโปรตีพลาสท์ที่ได้จากแต่ละสายพันธุ์




ตารางที่ 10 Analysis of Variance ของจำนวนโปรตอพลาสต์ (\times ล้าน) ต่อหนั้นก้าวในสตด 1 กรัม^{จากมันฝรั่ง 7 พันธุ์ที่ได้เพาะเลี้ยงในสภาพ *in vitro*}

Source	df	Sum of Squares	Mean Square	F-value	Pr>F
Model	6	160.7426007	26.7904334	1.69	0.1446
Error	48	762.1501262	15.8781276		
Corrected Total	54	922.8927268			
R-square		c.v.	Root MSE	Protoplast Mean	
0.174173		61.12633	3.984737	6.51885455	



ภาพที่ 1 โปรตอพลาสต์มันฝรั่งที่แยกได้ ภาพจากกล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 10×10




ภาพที่ 2 protoplast มันฝรั่ง ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ กำลังขยาย 10×40


3. การเพาะเลี้ยง protoplast มันฝรั่งให้เป็น microcalli

เมื่อนำ protoplast suspension มาเลี้ยงต่อใน petri dish โดยใช้อาหารสูตร CL ซึ่งมีวิญญาณ (agar) เป็นส่วนประกอบ พบว่ามีปัญหาการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์มาก จึงเป็นเหตุให้งานล่าช้า เพราต้องเริ่มเพาะเลี้ยงต้นมันฝรั่งใหม่ เพื่อเอาไปแยกprotoplast ปัญหาการปนเปื้อนดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการปัจจัยในสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม การควบคุมอุณหภูมิและการรักษาสภาพปลอดเชื้อในบริเวณทดลองไม่ดีพอสำหรับการเลี้ยงดูprotoplast เป็นเวลานานจนถึงการเกิด microcalli ขึ้น McDon ที่มีความสำคัญมาก ได้แก่ การกรอง (filter) แยกเอา protoplast ออกจากชั้นส่วนพืชที่ไม่ถูกย่อยด้วยเย็นไนร์ ซึ่งจำเป็นต้องทำในสภาพที่ปลอดเชื้อ ภายหลังได้ข้อเปลี่ยนสถานที่ทำการทดลองเพื่อการเพาะเลี้ยงprotoplast มีการควบคุมแสง อุณหภูมิ และความสะอาดของห้องปฏิบัติการเป็นอย่างดี ผลการทดลองพบว่าprotoplast ที่แยกได้จากมันฝรั่งทั้ง 7 พันธุ์สามารถเจริญเป็น microcalli ได้ภายใน 7 วัน ที่อุณหภูมิ 25°C โดยเฉลี่ย ซึ่ง microcalli เหล่านี้มีการเจริญพอกันได้ด้วยตาเปล่าใน 2 สัปดาห์ และหลังจากนั้นประมาณ 2

สปีเดนบานงันจะปรากฏสีเขียว ทั้งนี้หากต้องการจะเลี้ยงต่อให้ regenerate เป็นต้นพืชจะต้องขักนำให้เกิด differentiation โดยเปลี่ยนสูตรอาหาร ในการทดลองครั้งนี้ได้ทำถึงขั้นการเกิด microcalli เท่านั้น






3




4

ภาพที่ 3-4 ไพรโอเพลาสท์มันฝรั่งเริ่มแบ่งตัว หลังจากที่เลี้ยงใน CL medium 1-2 วัน






ภาพที่ 5, 6, 7 ไพรโอเพลาสท์มันฝรั่งมีการแบ่งตัวเป็นกลุ่มเซลล์ หลังจากที่เพาะเลี้ยงใน CL medium ประมาณ 1 สปดาห์



ภาพที่ 8 Microcalli ที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงไพรโอเพลาสท์มันฝรั่งซึ่งแยกจาก mesophyll ของต้นที่เจริญในสภาพ in vitro ภาพจากกล้อง stereoscope กำลังขยายต่ำ



ภาพที่ 9-10 Microcalli จากใบโพธิพลาสม์มันฝรั่ง อายุประมาณ 4 สัปดาห์ เลี้ยงในอาหารสูตร cell layer ภาพจากกล้อง stereoscope กำลังขยายสูง



วิจารณ์ผล (Discussion)

การแยกเซลล์ mesophyll ของใบมันฝรั่งเป็นprotoplastที่เพื่อการเพาะเลี้ยงเซลล์แล้ว กระบวนการให้อกเป็นต้นพืชได้นั้นเป็นเทคนิคที่มีประวัติยาวนานในภาคตัด มากพบว่าพืชที่ได้มาโดยวิธีนี้มีภาระกลยุทธ์นิดที่เรียกว่า somaclonal variation ซึ่งเคยมีรายงานว่าพบลักษณะต้านทานโรค ผู้วิจัยจากจะลองใช้เทคนิคขั้นสูงต่อ เช่น ทำ protoplast fusion หรือใส่ยีนหน่วยใหม่เข้าไปโดยวิธี microinjection ทว่าวิธีการตอนเริ่มต้นที่ต้องทำการเพาะเลี้ยงพืชจากเซลล์เดียวแบบนี้ต้องอาศัยประสบการณ์และสภาพห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม มีฉะนั้นจะพบปัญหาการปนเปื้อนอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินงานของงานวิจัยนี้เป็นไปอย่างล่าช้าเนื่องจากต้องค่อยแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนตลอดเวลา เป็นสาเหตุที่ต้องกลับไปเริ่มการเพาะเลี้ยงต้นมันฝรั่งใหม่หลายครั้งก่อนที่จะแยกprotoplast เมื่อแก้ปัญหาโดยเปลี่ยนสถานที่ทดลองสำหรับงาน *in vitro* แล้วก็พบปัญหานี้ขึ้นตอนการกรองprotoplastที่หลังแยกเสร็จแล้ว และปัญหานี้ส่วนหลังได้แก้การปนเปื้อนจากเชื้อรูจุลินทรีย์ในอาหารเลี้ยงprotoplast (CL medium) เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้แผ่นกรองที่มีคุณภาพเหมาะสมเพื่อกรองส่วนผสมของสูตรอาหาร เพาะต้องรักษาคุณสมบัติของฮอร์โมนและองค์ประกอบอื่น ๆ ให้โดยไม่ผ่านการนึ่งม่าเรือ งานในขั้นนี้ได้ผลดีเมื่อใช้ filter membrane ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรู 0.2 ไมโครเมตรนิดที่เป็นในลอน ส่วนนิดที่ทำด้วยเซลล์ลูโคสในกระบวนการนี้สามารถจัดการปนเปื้อนของอาหาร แม้ว่าจะใช้สองแผ่นขั้นกันก็ตามอย่างไรก็ตามโดยสรุปแล้วผู้วิจัยสามารถทำการเพาะเลี้ยงมันฝรั่งในสภาพ *in vitro* แล้วทำการแยกprotoplastจากเซลล์ mesophyll นำprotoplastที่แยกได้ไปเพาะเลี้ยงเป็น microcalli หรือ calli อายุกว่า 4 สัปดาห์ได้เป็นผลสำเร็จภายใต้ข้อจำกัดต่าง ๆ ของสถานที่ที่ทำการทดลอง งานวิจัยนี้จำเป็นต้องสิ้นสุดลงโดยไม่ได้ลองย้ำ microcalli หรือ calli อายุ 4 สัปดาห์ไปเลี้ยงต่อในสูตรอาหารที่สามารถกระตุ้น differentiation ทั้งนี้ความสามารถในการสร้าง calli เป็นคุณสมบัติทางชีววิทยาซึ่งอาจจะแตกต่างกันระหว่างพืชชนิดเดียวกันตัวอย่างเช่น ข้าวพันธุ์ japonica สร้าง microcalli ได้ดีกว่าพันธุ์ indica เป็นต้น



งานวิจัยครั้งนี้ได้ทดลองทำกับมันฝรั่ง 7 พันธุ์ ซึ่งบางพันธุ์ได้มีการข้างของถึงลักษณะความต้านทานต่อเรื้อร้า *P. infestans* เรื้อร้าเหตุของโรคใบในมั่น (late blight) ตัวอย่างเช่น พันธุ์ B6080 WV 21 มียีน $R_1R_2R_3$ ซึ่งจะร่วมกันแสดงออกเป็น field resistance ในขณะที่พันธุ์ Kennebec มี major gene, R , เพื่อต้านทานโรคใบในมั่น และพันธุ์ Russet Burbank และพันธุ์ Bintje มี gene r คือไม่ต้านทานต่อ *P. infestans* ผลการทดลองพบว่าทุกพันธุ์สามารถให้จำนวนโปรต็อพลาสต์ต่อน้ำหนักใบสด 1 กรัมในระดับที่น่าพอใจ และค่าเฉลี่ยที่ได้ในเมื่อความแตกต่างกันทางสถิติ ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้ไม่ได้แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง protoplast yield กับพันธุกรรมในลักษณะความต้านทานต่อเรื้อร้า *P. infestans* ในเรื่องนี้ได้มีผู้วิจัย (Rothlisberger et al 1984) เสนอแนวคิดไว้ว่าคุณสมบัติของ cell wall ของมันฝรั่งแต่ต่างกันผ่านเซลล์ของพันธุ์ต้านทานนั้นทบทวนต่อการบุกรุกของเรื้อร้ามากกว่าของพันธุ์อ่อนแอ และพันธุ์ต้านทานนำที่จะให้ protoplast yield ต่ำกว่าพันธุ์อ่อนแอ ซึ่งหมายความต่อไปว่าได้ว่าพันธุ์ต้านทานมี cell wall ซึ่งยากต่อการสลายของเชื้อไวรัสจากเรื้อร้า (pathogen) หรือ เอ็นไซม์ (cellulase, pectinase) ที่ใช้ในเทคนิคการแยกโปรต็อพลาสต์

ในงานวิจัยนี้พิจารณาทดลองได้มาจากการเพาะเลี้ยงแบบ *in vitro* อายุประมาณ 4 สัปดาห์ แต่ Rothlisberger และคณะ ใช้พืชจากแปลงปุaju ซึ่งอาจจะได้รับเรื้อร้า *P. infestans* มาบ้างแล้ว หากเป็นดังนี้จริงมันฝรั่งพันธุ์ต้านทานคงถูกกระตุ้นที่ระบบภูมิคุ้มกัน (defense mechanisms) ขึ้นเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในผนังเซลล์ เมื่อนำเซลล์เหล่านี้ไปแยกโปรต็อพลาสต์จะพบว่าได้จำนวนโปรต็อพลาสต์ต่ำ นอกจากนี้ Rothlisberger และคณะยังได้สังเกตเห็นการเกิดสีน้ำตาล (browning) ในพืชต้านทานขณะทำการแยกโปรต็อพลาสต์ ซึ่งจะเป็นพวก phenolic compounds ที่พันธุ์ต้านทานปล่อยออกมานะ ในอนาคตหากต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของ cell wall กับเรื้อร้าตัวนี้สิ่งที่ทดลองเพิ่มเติมได้ คือ การ challenge ระบบภูมิคุ้มกันของพืชในระยะที่เลี้ยงแบบ *in vitro* ในชุดแก้วเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แล้วสังเกตความแตกต่างระหว่างมันฝรั่งพันธุ์ต้านทานกับพันธุ์อ่อนแอ แต่เนื่องจาก *P. infestans* เลี้ยงยาก คือต้องใช้อาหารและสภาพการเพาะเลี้ยงเป็นพิเศษจึงจะมีเรื้อร้าพร้อมเพียงแก่การวิจัย ต่อ ความยากในการเลี้ยง *P. infestans* บริสุทธิ์จึงเป็นอุปสรรคประการหนึ่ง



เอกสารอ้างอิง
(References)

- Behnke, M. 1979. Selection of potato callus for resistance to culture filtrates of *Phytophthora infestans* and regeneration of resistant plants. *Theoretical and Applied Genetics* 55: 69-71.
- Behnke, M. 1980. General resistance to late blight of *Solanum tuberosum* plants regenerated from callus resistant to culture filtrates of *Phytophthora infestans*. *Theoretical and Applied Genetics* 56: 151-152.
- Haberlach, G. T., B. A. Cohen, N. A. Reichert, M. A. Baer, L. E. Towill, and J. P. Helgeson. 1985. Isolation, culture, and regeneration of protoplasts from potato and several related *Solanum* species. *Plant Science Letters* 39: 67-74.
- Roongruangsree, U. 1990. The use of protoplasts to study resistance to *Phytophthora infestans* in potato. Ph.D. Dissertation. West Virginia University, Morgantown, West Virginia. 228 pp.
- Rothlisberger, A. ; U. Heininger, and H.R. Hohl. 1984. Correlations between protoplast yield, tissue browning and late blight resistance in potato cultivars and wild *Solanum* spp. *Botanica Helvetica* 94 : 295-299.
- Shepard, J. F. 1980. Mutant selection and plant regeneration from potato mesophyll protoplasts. In: *Genetic Improvement of Crops, Emergent Techniques*, eds. I. Rubinstin, B. Genenbach, R. L. Phillips, and C. E. Green. Minneapolis, University of Minnesota Press. pp. 185-219.
- Shepard, J.F. 1981. Protoplasts as sources of disease resistance in plants. *Annual Review of Phytopathology* 19: 145-166.
- Shepard, J. F. 1982. Regeneration of potato leaf cell protoplasts. In: *Variability in plant regenerated from tissue culture*. E. K. Earl, Y. Demarly (eds.). pp. 47-57.
- Shepard, J. F. , and R. E. Totten. 1977. Mesophyll cell protoplasts of potato: isolation, proliferation, and plant regeneration. *Plant Physiology* 60: 313-316.



- Toxopeus, H. J. 1964. Treasure-digging for blight resistance in potatoes. *Euphytica* 13: 206-222.
- Tomiyama, K., H. S. Lee, and N. Doke. 1974. Effect of homogenates of *Phytophthora infestans* on the potato-tuber protoplasts. *Annals of Phytopathological Society of Japan* 40: 70-72.
- Yamada, Y., Z. Q. Yang, and D. T. Tang. 1986. Plant regeneration from protoplast-derived callus of rice (*Oryza sativa L.*). *Plant Cell Reports* 4: 85-88.