



การทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีป้องกันโรคแบคทีเรียพัสดุลของถั่วเหลือง

2) การศึกษาความสัมพันธ์ของพันธุ์ถั่วเหลือง ชนิดของสารเคมี ระยะห่างใน
การพ่นสารเคมีและเวลาปลูกต่อการป้องกันกำจัดโดยวิธีสมบูรณ์

Effectiveness of Certain Chemicals Against Bacterial Pustule

of Soybean. II) A Study on the Relationship of Varieties.

Certain Chemicals, Spraying Intervals and Planting Dates by
Integrated Control Measure

ประพันธ์ ไオスตาพันธ์, นิรภิค กิจรุ่งเรือง, สมจิตต์ กิจรุ่งเรือง

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290



การทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีป้องกันโรคแบคทีเรียพัสดุลของถั่วเหลือง

2) การศึกษาความสัมพันธ์ของพันธุ์ถั่วเหลือง ชนิดของสารเคมี ระยะห่างในการพ่นสารเคมีและเวลาปลูกต่อการป้องกันกำจัดโดยวิธีสมบูรณ์

Effectiveness of Certain Chemicals Against Bacterial Pustule of Soybean. II) A Study on the Relationship of Varieties.

Certain Chemicals, Spraying Intervals and Planting Dates by Integrated Control Measure

ประพันธ์ โวสสถาพันธุ์, นิรนิต กิจรุ่งเรือง, สมจิตต์ กิจรุ่งเรือง
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

บทคัดย่อ

การศึกษาความสัมพันธ์ของพันธุ์ถั่วเหลือง ชนิดของสารเคมี ระยะห่างในการพ่นสารเคมี และเวลาปลูกต่อการป้องกันกำจัดโรคแบคทีเรียพัสดุลของถั่วเหลืองโดยวิธีสมบูรณ์ในสภาพแปลงทดลอง เมื่อปี พ.ศ. 2530-2531 ณ. สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยปลูกถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.1 และ สจ.2 สารเคมีที่ใช้ได้แก่ copper oxychloride + zineb + maneb และ cupric hydroxide โดยทำการพ่นสารเคมีทุก 7 วัน และ 14 วัน เริ่มนับเมื่อถั่วเหลืองอายุ 30 วันหลังจาก蒼นา 4 ครั้ง และเวลาปลูกถั่วเหลือง จำนวน 3 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม กันยายน และตุลาคม ซึ่งแต่ละครั้งห่างกัน $1\frac{1}{2}$ เดือน พบว่า การใช้สารเคมี copper oxychloride + zineb + maneb กับถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.4 โดยพ่นทุก 7 วัน จะให้ระดับอาการของโรคต่ำสุด และระดับอาการของโรคจะลดลงในเดือนกรกฎาคมรุนแรงมากกว่าในเดือนกันยายน และตุลาคม



ผลการทดลองพบว่า พันธุ์ถั่วเหลืองและชนิดของสารเคมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญยิ่งต่อเนื้อง 100 เมล็ด เท่านั้น แต่ไม่มีอิทธิพลต่อมลพัสดุต่อไปโดยส่วนรวม แต่เวลาปฐกกลับมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทั้งต่อน้ำหนัก 100 เมล็ด และผลผลิตต่อไร่

สำหรับอิทธิพลของปฏิกิริยาawanที่มีผลต่อมลพัสดุต่อไร่นี้มีเพียง 2 ชนิดเท่านั้นคือปฏิกิริยาawanระหว่างระบะยะห่างในการพ่นสารเคมีกับชนิดของสารเคมี และเวลาปฐกับพันธุ์ถั่วเหลือง ส่วนน้ำหนักต่อ 100 เมล็ดนั้น พบว่าปฏิกิริยาawanมีอิทธิพลแทนทุกชนิด ยกเว้นปฏิกิริยาawanระหว่างระบะยะห่างในการพ่นสารเคมีกับเวลาปฐก

ในการทดลองนี้พบว่า การใช้ถั่วเหลืองพันธุ์ SJ.4 × copper oxychloride + zineb + maneb x 14 วัน x 16 ดูลากร 2530 ในน้ำหนักต่อ 100 เมล็ดเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 18.42 กรัม การใช้ถั่วเหลืองพันธุ์ SJ.1 × 18 กรกฎาคม 2530 ในค่าเฉลี่ยผลผลิตต่อไร่สูงสุดเท่ากับ 336.70 กิโลกรัม ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับพันธุ์ SJ.4 × 18 กรกฎาคม 2530 เช่นเดียวกับ การใช้ copper oxychloride + zineb + maneb x 7 วัน ที่ให้ค่าเฉลี่ยผลผลิตต่อไร่สูงสุดเท่ากับ 304.64 กิโลกรัม

Abstract

The study of relationship among soybean varieties, certain chemicals, spraying intervals, and planting dates was carried out at Maejo Institute of Agricultural Technology , Sansai, Chiangmai during 1987-1988 for the control of bacterial Pustule of soybean. The experiment used two varieties of soybean : SJ. 1 and SJ.4 ; two bacteriocides, copper oxychloride + zineb + maneb and cupric hydroxide ; two spraying intervals: 7 days and 14 days; and three planting dates ; July, September , and October. The experiment found that SJ.4 soybean variety treated copper oxychloride + zineb + maneb every 7 days showed the lowest bacterial pustule disease rating. Moreover, the disease rates was higher in July than September and October.



The results showed that soybean varieties and chemicals used had the significant effect on weight per 100 seeds but not on seed yield. However, planting dates had the significant effect on both weight per 100 seeds and seed yield.

The interaction effects between spraying intervals and type of bacteriocides, and also between soybean varieties and planting dates significantly affected seed yield. Weight per 100 seeds was affected by all type of interaction effect except the effect of spraying intervals and planting dates.

This experiment found that using SJ.4 soybean variety sprayed copper oxychloride + zineb + maneb every 14 days and planted on 16 October 1987 gave the highest weight per 100 seeds which was 18.42 grams. Using SJ. 1 soybean variety planted on 18 July 1987 gave the highest seed yield which was 336.70 kilograms and was not statistically different from seed yield obtained from SJ. 4 soybean variety planted on 18 July 1987. Using copper oxychloride + zineb + imaneb very 7 days also produced the highest seed yield which was 304.64 kilograms.



คำนำ

สาเหตุที่ทำให้ถัวเหลืองมีผลผลิตค้าก็วิโรค นอกจากโรคราษฎร์ โรคแอนแทรคโนส โรคราษฎร์ โรคใบค่าง โรคเมล็ดส้ม่วง และโรคอื่น ๆ ที่นับว่ามีความสำคัญแล้ว ยังพบว่า โรคแยกที่เรียลพัสตูล (Bacterial pustule) หรือโรคในจุดบุบหนองถัวเหลือง (สุกดุ๊ด และคณะ, 2529, สุกดุ๊ด และคณะ, 2530) ก็เป็นโรคที่ทำให้ความเสียหาย และพบหัวใจในแหล่งปลูกถัวเหลือง ของประเทศไทย ในต่างประเทศมีรายงานว่า โรคนี้จะเข้าทำลายถัวเหลืองในระยะออกดอก ทำให้คุณภาพและผลผลิตลดลงซึ่งปัจจุบันนี้พบมากแห้งลอกลง 40 เปอร์เซ็นต์ โปรดีนในเมล็ดลอกลง 11 เปอร์เซ็นต์ น้ำมันในเมล็ดลอกลง 9.4 เปอร์เซ็นต์ และความคงคล่อง 20 เปอร์เซ็นต์ (Vichitrananda, 1975) "สาหรับในประเทศไทย" จากการศึกษาพบว่า "โรคนี้จะทำให้ผลผลิตถัวเหลืองลดลง 20.7 เปอร์เซ็นต์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และ 34.9 เปอร์เซ็นต์ที่สถาบันวิจัยวิศวกรรมสุรัรณาจักษ์สิริกิจ อำเภอปากช่อง จังหวัดราชบุรี นอกจากนี้เชื้อสาเหตุของโรคนี้สามารถถ่ายทอดไปทางเมล็ดได้ตั้งแต่ 1-60 เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของถัวเหลืองว่าทนทานหรืออ่อนแอก่อโรคนี้ (นิรนาม, 2526) สาหรับถัวเหลืองพันธุ์ที่ทางราชการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกก็แก่ พันธุ์ ๙.๑, สจ.๒, สจ.๔ และ สจ.๕ พบว่าได้รับความเสียหายจากการเข้าทำลายของโรคต้องกว่า ๕ ปี (บริษัท, 2520; นิรนาม, 2526; สุกดุ๊ด และคณะ, 2530)

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนี้ แสดงว่าโรคนี้เป็นภัยหาที่สำคัญ และต้องการการแก้ไขโดยเร่งด่วน การแก้ไขปัญหาโดยใช้สารเคมี หากไก่ผลักด้วยแก้ปัญหาได้โดยฉบับพลัน ถังน้ำในปี พ.ศ. 2528 - 2529 ผู้วิจัยจึงได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีจำนวน 6 ชนิดต่อโรคนี้ในห้องปฏิบัติการ และแปลงทดลอง พบว่า มีสารเคมี 2 ชนิดที่ให้ผลคือ Copper oxychloride + zinc + maneb และ cupric hydroxide ให้ผลคือในการป้องกันกำจัดโรคนี้และยังให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า (บรรพันธ์ และคณะ, 2529) ถังน้ำในการทดลองครั้งนี้จึงได้น้ำสารเคมีทึบสองชนิดนั้นมาเก็บไว้กับวิธีการป้องกันกำจัดทางเคมีกรรม เพื่อที่จะศึกษาความสัมพันธ์ของพันธุ์ถัวเหลือง ชนิดของสารเคมี ระยะห่างในการเพาะพันธุ์สารเคมี และเวลาปลูกต่อการป้องกันกำจัดโดยวิธีสมบูรณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในการนำไปใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตของถัวเหลืองต่อไปในอนาคต

อุปกรณ์และวิธีการ

การศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมีในสภาพแเปลงนทดลองในดินฟุ่น

การศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมีในสภาพแเปลงนทดลอง ทำการทดลองในดินฟุ่น ปี พ.ศ. 2530 ที่แปลงทดลองของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร สถาบันเทคโนโลยี-การเกษตรแม่โจ้ อําเภอสันพราย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาทดลองตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2530 ถึงเดือน มกราคม 2531 โดยปัจจัยตัวแปรอย่างพื้นฐาน คือ สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันแมลง จำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2530 , 1 กันยายน 2530 และ 16 ตุลาคม 2530 ชั่วโมงต่อครั้ง ผ่านกัน 45 วัน คลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยยาฆ่าแมลงร้อไซด์ 50 (Orthocide 50) อัตรา 3 กรัมต่อมวล 1 กิโลกรัม และเข้าไวนิลโซเดียม อัตรา 225 กรัมต่อมวล 10 กิโลกรัม วางแผนการทดลองแบบ Split-split plot design โดยมีการจัด main-plot เป็นแบบ randomized complete block มีห้องหมก 4 ชั้น วิธีการทดลอง (treatment) ใน main-plot คือ พื้นที่ตัวน้ำหนึ่งมีอยู่ 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ สจ.1 และ สจ.4 วิธีการทดลองใน sub-plot คือ ชนิดของสารเคมีที่พ่น มีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่ copper oxychloride + zinc + maneb อัตราความเข้มข้น 2,200 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ; cupric hydroxide อัตรา 1,100 ppm หรือใช้สารเคมีอัตรา 80 และ 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ตามลำดับ และการพ่นสารเคมีทุกชนิดจะผสมด้วย sticker อาร์โกลปอล อัตรา 10 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร โดยเริ่มทำการพ่นสารเคมีเมื่อตัวเหลืองอายุ 30 วันหลังงอก จำนวน 4 ครั้ง สำหรับแปลงทดลองเปรียบเทียบ (control) ไม่มีการพ่นสารเคมีเลย ส่วนวิธีการทดลองใน sub-sub-plot คือ ระยะห่างในการพ่นสารเคมี ชั่วโมง 3 ระยะ ได้แก่ 7 , 14 วัน และไม่มีการพ่นสารเคมี และเวลาในการป้องกันมีอยู่ 3 ช่วง ตามเวลาป้องกันตั้งแต่ตัวข้างตน จึงเป็นแบบ factorial (สุรพล, 2526)

ในพื้นที่แปลงทดลองมีงอกเป็นแปลงย่อย (sub-sub-plot) มีขนาด 3.00×5.00 เมตร ระยะระหว่างแปลง 50 เซนติเมตร ระยะระหว่างหลุม 20 เซนติเมตร แต่ละแปลง อยู่ป้อม 6 แปลง ระยะระหว่างแปลงย่อย 1 เมตร มีแพลตต์หลุมจำนวน 2 แปลง ห่างกัน 50 เซนติเมตร ล้อมรอบแปลงย่อยทั้งหมด ทำการใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่



แบ่งไว้ 2 ครั้ง ๆ แรกไว้ 25 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อถ้าเหลือของอายุ 15 วันหลังจาก ครั้งที่สอง ให้เมื่อถ้าเหลือของอายุ 40 วันหลังจาก ในอัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ และสำหรับยาฆ่าแมลงไอล์ยา ฟูราган 3 จี อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ พร้อมกับการใช้ปุ๋ยกรังแทรกโดยใช้โรยรอบต้น หลังจาก ปลูกเสร็จแล้ว พ่นยา根กำจัดแมลงค่อไปใช้อโซครินพ่นจำนวน 3 ครั้ง แต่ละครั้ง ห่างกัน 14 วัน ถ้ามีโรคนาน้ำด่างของถั่วเหลืองจะใช้สารเคมีออฟรอน 35 WP. และ ริกโคมิล MZ 72 WP. และมีโรคราสินิของถั่วเหลืองจะใช้ยาเบลีตัน 25 WP. และทำการ กำจัดวัชพืชในแปลงทดลองโดยใช้มือบนความเหมาะสม ตรวจสอบอาการของโรคแพททีเรียลส์คูล เมื่อถ้าเหลือของอายุ 30, 45, 60, 75 และ 90 วันหลังจาก โดยการตรวจให้คะแนนพิเศษที่ซึ่งน้ำหนักเมล็ดถั่วเหลืองเพื่อหาผลผลิต ต่อไร่ โดยใช้เครื่องชั่ง Berkel และชั่งน้ำหนักต่อ 100 เมล็ดค่าวายเครื่องชั่ง Mettler P 1000 แล้วทำการเปลี่ยนน้ำหนักของเมล็ดเพื่อหาผลผลิตต่อไร่ และน้ำหนัก 100 เมล็ดให้เป็นความชื้น มาตรฐานที่ 12 เปอร์เซนต์ โดยใช้สูตรดังนี้

$$Y = \frac{X(100 - b)}{100 - 12}$$

เมื่อ y = น้ำหนักเมล็ดที่มีความชื้น 12 เปอร์เซนต์

x = น้ำหนักจริงของเมล็ด

b = เปอร์เซนต์ความชื้นของเมล็ดที่วัดได้

1. วิจัยและสถานที่

ทั้งหมดเดือนกรกฎาคม 2530 ถึง กรกฎาคม 2531 ณ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ การเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่



ผลการทดลอง

การศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมีในสภาพแเปล่งหลังในทุกผ่าน

1. การศึกษาระดับอาการของโรคแบคทีเรียลส์คูลบันถัวเหลือง

การวัดระดับอาการของโรคไครอสตองไว้ในตารางที่ 1 ปรากฏว่า ในเวลาปลูกครรงที่ 1 เมื่อถัวเหลืองอายุ 30 วันหลังออกจะไม่หนา rate ดับอาการของโรคบนถัวเหลืองหั้ง 2 พันธุ์เลย แต่เมื่อถัวเหลืองอายุ 45 วันจนถึง 90 วัน ระดับอาการของโรคบนถัวเหลืองหั้ง 2 พันธุ์จะเพิ่มขึ้น โดยระดับอาการจากการพ่นสารเคมี copper oxychloride + zinc + maneb จะคำสูตร ก็อปประมาณ 1-25% ของพืชที่ใบ สำหรับในแปลงที่ไม่มีการพ่นสารเคมี (control) จะแสดงอาการของโรคสูงสุดก็อปประมาณ 76-100% ของพืชที่ใบ และพบว่าเมื่อถัวเหลืองมีอายุ 90 วัน หลังออก ใบที่เคยเป็นโรคในทุก ๆ แปลงจะร่วงหมดเหลือเฉพาะใบที่ไม่เป็นโรคบนต้นถัวเหลือง สำหรับแปลงที่พ่นด้วยสารเคมีหั้งสองชนิด พบว่า ใบยังคงมีสีเขียวอยู่ และเหลือบนต้นมากกว่าแปลงที่ไม่มีการพ่นสารเคมี นอกจากโรคแบคทีเรียลส์คูลบันแล้วยังพบว่า มีโรคอื่น ๆ ระบาดอยู่ด้วย ได้แก่ โรคราสนิม โรคร้าน้ำค้าง และโรคใบค้าง เป็นต้น

สำหรับเวลาปลูกครรงที่ 2 และ 3 เมื่อถัวเหลืองอายุ 30 วันหลังออก จะแสดงอาการของโรคก่อประมาณ 1-25% ของพืชที่ใบบนถัวเหลืองหั้ง 2 พันธุ์ แต่เมื่อถัวเหลืองอายุ 45 วันจนถึง 90 วันเฉพาะแปลงที่ไม่มีการพ่นสารเคมีจะแสดงระดับอาการของโรคเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 26-50% ของพืชที่ใบ ส่วนแปลงอื่น ๆ จะมีระดับอาการของโรคเท่าเดิม และพบว่าเมื่อถัวเหลืองมีอายุ 75 วัน จนถึง 90 วันหลังออก ใบที่เคยเป็นโรคในทุก ๆ แปลงจะร่วงหมด

2. การศึกษาถึงผลผลิตและน้ำหนักต่อ 100 เมล็ดของถัวเหลือง

ผลผลิตต่อไร่

การทดลองพบว่า อิทธิพลหลักของเวลาปลูกมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ และยังพบว่าปฏิกริยา ร่วมระหว่างระยะห่างในการหันสารเคมีกับชนิดของสารเคมี และปฏิกริยาซึ่งมุ่งหวังพันธุ์ถัวเหลือง กับเวลาปลูกมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติเช่นเดียวกัน (ตารางผนวกที่ 1)



จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของปฏิกิริยาร่วมระหว่างพันธุ์ถัวเหลืองกับเวลาปลูก พบว่า พันธุ์ สจ.1 × เวลาปลูกครั้งที่ 1 (18 กรกฎาคม 2530) ให้ค่าเฉลี่ยผลผลิตต่อไร่สูงสุด 336.70 กิโลกรัม ซึ่งแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญกับ พันธุ์ สจ.4 × 18 กรกฎาคม 2530 ส่วนพันธุ์ สจ.1 × 16 ตุลาคม 2530, นั้นให้ค่าเฉลี่ยผลผลิตต่อไร่ต่ำสุดเท่ากับ 186.75 กิโลกรัม และไม่แตกต่างกับพันธุ์ สจ.4 × 16 ตุลาคม 2530 (ตารางที่ 2) สำหรับค่าเฉลี่ยของผลผลิตต่อไร่ เมื่อจำแนกตามพันธุ์ถัวเหลืองและเวลาปลูก พบว่า พันธุ์ สจ.1 และ สจ.4 ให้ผลผลิต 272.07 และ 264.71 กิโลกรัม ตามลำดับ. และเวลาปลูกครั้งที่ 1 (18 กรกฎาคม 2530) ครั้งที่ 2 (1 กันยายน 2530) และครั้งที่ 3 (16 ตุลาคม 2530) ให้ผลผลิต 319.81, 284.76 และ 200.61 กิโลกรัม ตามลำดับ (ตารางที่ 3)

ส่วนการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของปฏิกิริยา_rwm ระหว่างชนิดของสารเคมี กับระยะเวลาในการพ่นสารเคมีนั้น พบว่า copper oxychloride+zineb+maneb × 7 วัน, copper oxychloride+zineb+maneb × 14 วัน, cupric hydroxide × 7 วัน และ cupric hydroxide 14 วัน มีค่าเฉลี่ยผลผลิตต่อไร่ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมี copper oxychloride +zineb +maneb × 7 วัน ให้ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 304.64 กิโลกรัม สำหรับเมล็ดองค์คล่องเบรียบเทียน (ไม่มีการพ่นสารเคมี) นั้น ให้ค่าเฉลี่ยผลผลิตต่อไร่ต่ำสุดเท่ากับ 241.85 กิโลกรัม (ตารางที่ 4) สำหรับค่าเฉลี่ยของผลผลิตต่อไร่ เมื่อจำแนกตามชนิดของสารเคมี และระยะเวลาในการพ่นสารเคมี พบว่าสารเคมี copper oxychloride + zineb + maneb, cupric hydroxide และแบล็งท์ไม่มีการพ่นสารเคมี ให้ผลผลิต 302.30, 287.57 และ 241.85 กิโลกรัม ตามลำดับ และระยะเวลาในการพ่นสารเคมี เมื่อไม่มีการพ่นสารเคมี 7 วัน และ 14 วัน ให้ผลผลิต 241.85, 296.37 และ 293.50 กิโลกรัม ตามลำดับ (ตารางที่ 5)

น้ำหนักต่อ 100 เมล็ด

การทดลอง พบว่า อิทธิพลหลัก และปฏิกิริยา_rwm ส่วนใหญ่มีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเว้น อิทธิพลของระยะเวลาในการพ่นสารเคมี และปฏิกิริยา_rwm ระหว่างระยะเวลาในการพ่นสารเคมีกับเวลาปลูก (ตารางผนวกที่ 1)



จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของปฏิกรณ์ร่วมระหว่างพันธุ์ถัวเหลือง
ชนิดของสารเคมี ระยะห่างในการพ่นสารเคมี และเวลาปลูก แล้วพบว่า พันธุ์ สจ.4 × copper
oxychloride+zineb+maneb × 14 วัน × 16 ตุลาคม 2530 , สจ.4 × cupric
hydroxide × 14 วัน × 16 ตุลาคม 2530 , สจ.4 × copper oxychloride + zineb +
maneb × 14 วัน × 18 กรกฎาคม 2530 และ สจ.4 × copper oxychloride + zineb +
maneb × 7 วัน × 16 ตุลาคม 2530 เป็นกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยน้ำหนักต่อ 100 เมล็ดสูงสุด ซึ่งแตก
ต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีพันธุ์ สจ.4 × copper oxychloride + zineb +
maneb × 14 วัน × 16 ตุลาคม 2530 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 18.42 กรัม (ตารางที่ 6)
ส่วน สจ.4 × copper oxychloride + zineb +maneb × 14 วัน × 18 กรกฎาคม 2530 ,
สจ.4 × copper oxychloride + zineb + maneb × 7 วัน × 16 ตุลาคม 2530 , และ
สจ.4 × cupric hydroxide × 7 วัน × 16 ตุลาคม 2530 เป็นกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยสูงรองลงมา
สำหรับพันธุ์ สจ.1 × ไม่มีการพ่นสารเคมี × 1 กันยายน 2530 นั้นให้ค่าเฉลี่ยน้ำหนักต่อ 100 เมล็ด
ต่ำสุด ซึ่งเท่ากับ 12.51 กรัม และแตกต่างกับ สจ.1 × copper oxychloride+zineb +
maneb × 14 วัน × 1 กันยายน 2530 , สจ.1 × cupric hydroxide × 7 วัน × 1 กันยายน
2530 และ สจ.1 × ไม่มีการพ่นสารเคมี × 16 ตุลาคม 2530 อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

สำหรับค่าเฉลี่ยของน้ำหนักต่อ 100 เมล็ด เนื่องจากความพันธุ์ถัวเหลือง และเวลาปลูก
พบว่า พันธุ์ สจ.1 และ สจ.4 ให้น้ำหนักเท่ากับ 13.77 และ 16.13 กรัม ตามลำดับ และเวลา
ปลูก เมื่อ 18 กรกฎาคม, 1 กันยายน และ 16 ตุลาคม 2530 ให้น้ำหนัก 15.55 , 13.58 และ
15.71 กรัม ตามลำดับ (ตารางที่ 7) ส่วนค่าเฉลี่ยของน้ำหนักต่อ 100 เมล็ด เมื่อจำแนกตามชนิด
ของสารเคมี และระยะห่างในการพ่นสารเคมี พบว่า สารเคมี copper oxychloride + zineb +
maneb,cupric hydroxide และแปลงที่ไม่มีการพ่นสารเคมีให้น้ำหนัก 15.92 , 15.30 ,
และ 14.28 กรัม ตามลำดับ และระยะห่างในการพ่นสารเคมี เมื่อไม่มีการพ่นสารเคมี, 7 วัน
และ 14 วัน ให้น้ำหนัก 14.28 , 15.53 และ 15.69 กรัม ตามลำดับ (ตารางที่ 8)

ตารางที่ 1 ผลของการใช้สารเคมี 2 ชนิด ที่มีต่อระดับอาการของโรคแบกพืชเรียลพัสดุบนถั่วเหลืองพันธุ์ ๘๙.๑ และ ๘๙.๔

พันธุ์ น้ำมันเมือง	ชนิดของสารเคมี	ระยะเวลาใน การทดสอบ	ระดับอาการของโรคเมื่อเวลาปลูกครั้งที่ 1/ (18 กรกฎาคม 2530)						ระดับอาการของโรคเมื่อเวลาปลูกครั้งที่ 2 (1 กันยายน 2530)						ระดับอาการของโรคเมื่อเวลาปลูกครั้งที่ 3 (16 ตุลาคม 2530)														
			30 วัน			45 วัน			60 วัน			75 วัน			90 วัน			30 วัน			45 วัน			60 วัน			75 วัน		
			(วัน)			(วัน)			(วัน)			(วัน)			(วัน)			(วัน)			(วัน)			(วัน)			(วัน)		
๘๙.๑	Copper oxychloride +zineb+maneb	7	1	2	2	2	2	(ใบร่วง) ^{2/}	2	2	2	2	2	2	(ใบร่วง)	2	2	2	2	2	(ใบร่วง)	2	2	2	(ใบร่วง)	(ใบร่วง)	(ใบร่วง)		
		14	1	2	2	2	2	(ใบร่วง)	2	2	2	2	2	2	(ใบร่วง)	2	2	2	2	2	(ใบร่วง)	2	2	2	(ใบร่วง)	(ใบร่วง)	(ใบร่วง)		
	Cupric hydroxide	7	1	2	3	3	3	(ใบร่วง)	2	2	2	2	2	2	(ใบร่วง)	2	2	2	2	2	(ใบร่วง)	2	2	2	(ใบร่วง)	(ใบร่วง)	(ใบร่วง)		
		14	1	2	3	3	3	(ใบร่วง)	2	2	2	2	2	2	(ใบร่วง)	2	2	2	2	2	(ใบร่วง)	2	2	2	(ใบร่วง)	(ใบร่วง)	(ใบร่วง)		
๘๙.๔	ไม้ก้ารพ์พาราเคนี	-	1	3	5	5	5	(ใบร่วง)	2	2	2	2	2	2	(ใบร่วง)	2	2	2	2	2	(ใบร่วง)	2	2	3	(ใบร่วง)	(ใบร่วง)	(ใบร่วง)		
	Copper oxychloride +zineb + maneb	7	1	2	2	2	2	(ใบร่วง)	2	2	2	2	2	2	(ใบร่วง)	2	2	2	2	2	(ใบร่วง)	2	2	2	(ใบร่วง)	(ใบร่วง)	(ใบร่วง)		
		14	1	2	2	2	2	(ใบร่วง)	2	2	2	2	2	2	(ใบร่วง)	2	2	2	2	2	(ใบร่วง)	2	2	2	(ใบร่วง)	(ใบร่วง)	(ใบร่วง)		
	Cupric hydroxide	7	1	2	2	3	3	(ใบร่วง)	2	2	2	2	2	2	(ใบร่วง)	2	2	2	2	2	(ใบร่วง)	2	2	2	(ใบร่วง)	(ใบร่วง)	(ใบร่วง)		
		14	1	2	3	3	3	(ใบร่วง)	2	2	2	2	2	2	(ใบร่วง)	2	2	2	2	2	(ใบร่วง)	2	2	2	(ใบร่วง)	(ใบร่วง)	(ใบร่วง)		
	ไม้ก้ารพ์พาราเคนี	-	1	3	5	5	5	(ใบร่วง)	2	3	3	(ใบร่วง)	2	3	(ใบร่วง)	2	2	2	2	2	(ใบร่วง)	2	2	3	(ใบร่วง)	(ใบร่วง)	(ใบร่วง)		

หมายเหตุ 1/ ระดับอาการของโรค 1 = ไม่เป็นโรค , 2 = เป็นโรค 1-25% ของพืชที่ใบ , 3 = เป็นโรค 26-50% ของพืชที่ใบ , 4 = เป็นโรค 51-75% ของพืชที่ใบ
5 = เป็นโรค 76 - 100% ของพืชที่ใบ

2/ ใบร่วง = ใบที่เป็นโรคจะร่วง

18 กรกฎาคม 2530	336.70	302.92	319.81
1 กันยายน 2530	292.77	276.74	284.76
16 ตุลาคม 2530	186.75	214.45	200.61



ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของปฏิกิริยาเร็มระหว่าง พันธุ์ถัวเหลืองกับเวลาปลูก เมื่อศึกษาจากผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)

พันธุ์ถัวเหลือง × เวลาปลูก ^{1/}	ค่าเฉลี่ยของผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)
สม. 1 × 18 กรกฎาคม 2530	336.70 a
สม. 4 × 18 กรกฎาคม 2530	302.92 ab
สม. 1 × 1 กันยายน 2530	292.77 b
สม. 4 × 1 กันยายน 2530	276.74 b
สม. 4 × 16 ตุลาคม 2530	214.46 c
สม. 1 × 16 ตุลาคม 2530	186.75 c

หมายเหตุ การเปรียบเทียบใช้วิธี Least Significant Difference ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วย อักษรตัวเดียวกัน แสดงว่า มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ-

$$P < 0.05$$

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยของผลผลิตต่อไร่ ที่ความชื้น 12% (กิโลกรัม) เมื่อจำแนกตามพันธุ์ถัวเหลือง และเวลาปลูก

เวลาปลูก	ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)		ค่าเฉลี่ยของผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)
	พันธุ์ สม. 1	พันธุ์ สม. 4	
18 กรกฎาคม 2530	336.70	302.92	319.81
1 กันยายน 2530	292.77	276.74	284.76
16 ตุลาคม 2530	186.75	214.46	200.61
ค่าเฉลี่ย	272.07	264.71	



ตารางที่ 4 ผลของการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของปฏิกิริยาร่วมระหว่างชนิดของสารเคมีกับระยะเวลาในการพ่นสารเคมี เมื่อศึกษาจากผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)

สารเคมี × ระยะเวลาในการพ่นสารเคมี	ค่าเฉลี่ยของผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)
-----------------------------------	--

copper oxychloride + zineb + maneb x 7 วัน	304.64 a
copper oxychloride + zineb + maneb x 14 วัน	299.95 a
cupric hydroxide x 7 วัน	288.09 a
cupric hydroxide x 14 วัน	287.05 a
ไม่มีการพ่นสารเคมี	241.85 b

หมายเหตุ การเปรียบเทียบใช้วิธี Least Significant Difference ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วย อักษรตัวเดียวกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ

$$P < 0.05$$

ตารางที่ 5 ผลของการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลผลิตต่อไร่ที่ความชื้น 12% (กิโลกรัม) เมื่อจำแนกตามชนิดของสารเคมี และระยะเวลาในการพ่นสารเคมี

ระยะเวลาในการพ่นสารเคมี (วัน)	ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)				ค่าเฉลี่ย ของผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)
	copper oxychloride +zineb + maneb	cupric hydroxide	ไม่มีการ พ่นสารเคมี	ค่าเฉลี่ย	
0	-	-	241.85	241.85	
7	304.64	288.09	-	296.37	
14	299.95	287.05	-	293.50	
ค่าเฉลี่ย	302.30	287.57	241.85		



ตารางที่ 6 ผลของการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของปฏิกิริยาเริ่มระหว่างพันธุ์ถั่วเหลือง ชนิดของสารเคมี ระยะห่างในการพ่นสารเคมี และเวลาปลูก เมื่อศึกษาจากน้ำหนักต่อ 100 เม็ด (กรัม)

พันธุ์ถั่วเหลือง * ชนิดของสารเคมี * ระยะห่างในการพ่นสารเคมี * เวลาปลูก	ค่าเฉลี่ยของน้ำหนักต่อ 100 เม็ด (กรัม)
--	--

ส.๗.๔ * Copper oxychloride+Zineb+maneb * 14 วัน * 16 กค. 2530	18.42 a
ส.๗.๔ * Cupric hydroxide * 14 วัน * 16 กค. 2530	18.35 a
ส.๗.๔ * copper oxychloride+zineb+maneb * 14 วัน * 18 กค. 2530	18.07 ab
ส.๗.๔ * copper oxychloride+zineb+maneb * 7 วัน * 16 กค. 2530	17.68 abc
ส.๗.๔ * cupric hydroxide * 7 วัน * 16 กค. 2530	17.43 bc
ส.๗.๔ * copper oxychloride+zineb+maneb * 7 วัน * 18 กค. 2530	17.22 cd
ส.๗.๔ * ไม่มีการพ่นสารเคมี * 0 วัน * 16 กค. 2530	17.09 cd
ส.๗.๔ * copper oxychloride+zineb+maneb * 7 วัน * 18 กค. 2530	16.80 de
ส.๗.๔ * cupric hydroxide * 14 วัน * 18 กค. 2530	16.50 def
ส.๗.๑ * copper oxychloride+zineb+maneb * 7 วัน * 16 กค. 2530	16.33 efg
ส.๗.๑ * copper oxychloride+zineb+maneb * 14 วัน * 16 กค. 2530	16.21 efg
ส.๗.๔ * ไม่มีการพ่นสารเคมี * 0 วัน * 18 กค. 2530	16.06 fg
ส.๗.๔ * copper oxychloride+zineb+maneb * 14 วัน * 1 กย. 2530	15.88 g
ส.๗.๔ * cupric hydroxide * 14 วัน * 1 กย. 2530	15.22 h
ส.๗.๔ * copper oxychloride+zineb+maneb * 7 วัน * 1 กย. 2530	15.21 hi
ส.๗.๔ * cupric hydroxide * 7 วัน * 1 กย. 2530	15.08 hi
ส.๗.๑ * cupric hydroxide * 7 วัน * 16 กค. 2530	15.04 hi
ส.๗.๑ * copper oxychloride+zineb+maneb * 14 วัน * 18 กค. 2530	15.04 hi
ส.๗.๑ * copper oxychloride+zineb+maneb * 7 วัน * 18 กค. 2530	14.76 ij
ส.๗.๑ * ไม่มีการพ่นสารเคมี * 0 วัน * 18 กค. 2530	14.37 j
ส.๗.๑ * cupric hydroxide * 14 วัน * 18 กค. 2530	14.36 j
ส.๗.๑ * cupric hydroxide * 7 วัน * 18 กค. 2530	14.20 jk
ส.๗.๑ * cupric hydroxide * 14 วัน * 1 กย. 2530	13.70 k
ส.๗.๑ * copper oxychloride+zineb+maneb * 7 วัน * 1 กย. 2530	13.62 k
ส.๗.๑ * cupric hydroxide * 14 วัน * 16 กค. 2530	13.38 kl
ส.๗.๔ * ไม่มีการพ่นสารเคมี * 0 วัน * 1 กย. 2530	13.11 lm
ส.๗.๑ * copper oxychloride+zineb+maneb * 14 วัน * 1 กย. 2530	13.08 lmn
ส.๗.๑ * cupric hydroxide * 7 วัน * 1 กย. 2530	13.01 lmn
ส.๗.๑ * ไม่มีการพ่นสารเคมี * 0 วัน * 16 กค. 2530	12.54 mn
ส.๗.๑ * ไม่มีการพ่นสารเคมี * 0 วัน * 1 กย. 2530	12.51 n

หมายเหตุ การเปรียบเทียบใช้วิธี Least Significant Difference ค่าเฉลี่ยตามค่าวัยอักษร
เหมือนกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ $P < 0.05$



ตารางที่ 7 ผลดงค่าเฉลี่ยของน้ำหนักต่อ 100 เมล็ด (กรัม) เมื่อจำแนกตามพันธุ์ถัวเหลืองและเวลาปลูก

เวลาปลูก	น้ำหนักต่อ 100 เมล็ด(กรัม)		ค่าเฉลี่ยของ น้ำหนักต่อ 100 เมล็ด (กรัม)
	พันธุ์ สจ.1	พันธุ์ สจ.4	
18 กันยายน 2530	14.48	16.62	15.55
1 กันยายน 2530	12.93	14.23	13.58
16 ตุลาคม 2530	13.89	17.53	15.71
ค่าเฉลี่ย	13.77	16.13	

ตารางที่ 8 ผลดงค่าเฉลี่ยของน้ำหนักต่อ 100 เมล็ด (กรัม) เมื่อจำแนกตามชนิดของสารเคมีและระยะเวลาในการเพ้นสสารเคมี

ระยะเวลาในการเพ้นสสารเคมี (วัน)	ชนิดของสารเคมี			ค่าเฉลี่ยของ น้ำหนักต่อ 100 เมล็ด (กรัม)
	ไม่มีการเพ่น	copper oxychloride +zineb + maneb	cupric hydroxide	
0	14.28	-	-	14.28
7	-	15.73	15.33	15.53
14	-	16.11	15.27	15.67
ค่าเฉลี่ย	14.28	15.92	15.30	



วิจารณ์ผล

จากการศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมีต่อโรคแบคทีเรียลัพส์ทูลของถั่วเหลืองในสภาพแเปลงนหลักในฤดูกาลนี้ พบว่าระดับอาการของโรคบนถั่วเหลือง ซึ่งปลูกในเดือนกรกฎาคม เมื่ออายุ 30 วันหลังออก芽ไม่เกิดขึ้น เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกในเดือนกันยายน และตุลาคม จะเป็นโรคประมาณ 1-25% ของพืชที่ใบ แต่เมื่อถั่วเหลืองอายุ 45 วันขึ้นไป อาการของโรคเมื่อปลูกในเดือนกรกฎาคม จะรุนแรงมากขึ้นกว่าการปลูกในเดือนอื่น ๆ สำหรับการเปรียบเทียบของสารเคมี พมว่า copper oxychloride + zineb + maneb จะแสดงออกอาการของโรคน้อยกว่า cupric hydroxide โดยเฉพาะเมื่อปลูกในเดือนกรกฎาคม ซึ่งตรงกับรายงานของ ประพันธ์ และคณะ (2529) และการพ่นสารเคมีทุก 7 วัน จะให้ระดับอาการของโรคต่ำกว่าทุก 14 วัน

สำหรับผลผลิตต่อไร่ พมวัตถุการปลูกถั่วเหลืองทั้งพันธุ์ สจ.1 และ สจ.4 ในเดือนกรกฎาคม จะให้ผลผลิตสูงกว่าการปลูกในเดือนกันยายน และตุลาคม ส่วนชนิดของสารเคมีนี้ พมว่า การพ่นสารเคมีทั้ง 2 ชนิด ทุก 7 วัน หรือ 14 วัน จะให้ผลผลิตมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ย่างไรก็ตาม copper oxychloride + zineb + maneb ทุก 7 วัน จะให้ผลผลิตสูงสุด ซึ่งจะเห็นได้ว่า copper oxychloride + zineb + maneb จะให้ผลลัพธ์กว่า cupric hydroxide ถึงแม้ว่าจะใช้ความเข้มข้นสูงกว่า แต่เมื่อคิดถึงผลตอบแทนที่ได้รับเนื่องจากการพ่นสารเคมีแล้ว จะคุ้นค่ากว่า เนื่องจากราคาขายในห้องตลาดสูงกว่า (ประพันธ์ และคณะ, 2529)

เมื่อพิจารณาถึงน้ำหนักต่อ 100 เมล็ด พมว่า การใช้สัลเฟอร์พันธุ์ สจ.4 × copper oxychloride + zineb + maneb × 14 วัน × 16 ตุลาคม 2530 ให้น้ำหนักของเมล็ดสูงสุด โดยทั้งพันธุ์ สจ.4 จะให้น้ำหนักเมล็ดสูงกว่าพันธุ์ สจ.1 และสารเคมี copper oxychloride + zineb+maneb ก็ให้ผลลัพธ์กว่า cupric hydroxide ซึ่งตรงกับรายงานของประพันธ์ และคณะ (2529) นอกจากนี้การปลูกในเดือนตุลาคม จะให้ผลลัพธ์สูง รองลงมาจะเป็นเดือนกรกฎาคม และกันยายน ตามลำดับ สำหรับการพ่นสารเคมีควรพ่นทุก 7-14 วัน จะให้น้ำหนักของเมล็ดสูงกว่า ทุก 7 วัน



สรุปผล

การใช้สารเคมี copper oxychloride + zinceb + maneb กับตัวเหลืองพันธุ์ สจ.4 โดยหมัก 7 วัน จะให้ระดับอาการของโรคแมกที่เรียลพัสดูลดลงค่อนข้าง สจ.4 โดยหมัก 7 วัน จะให้ระดับอาการของโรคแมกที่เรียลพัสดูลดลงค่อนข้าง และระดับอาการของ โรคจะระบาด ในเดือนกรกฎาคม รุนแรงมากกว่าเดือนกันยายน และตุลาคม

ตัวเหลืองและปนิคของสารเคมีมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญยิ่งต่อน้ำหนัก 100 เมล็ด เท่านั้น แต่ไม่มีอิทธิพลต่อผลผลิตต่อไร่โดยส่วนรวม แต่เวลาปลูกกลับมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง ทึบต่อน้ำหนัก 100 เมล็ด และผลผลิตต่อไร่

สำหรับอิทธิพลของปฏิกิริยาเริ่มเห็นผลต่อผลผลิตต่อไร่น้ำแข็ง 2 ชนิดเท่านั้น คือ ปฏิกิริยาเริ่มระหว่างระยะห่างในการพ่นสารเคมีกับชนิดของสารเคมี และเวลาปลูกกับพันธุ์ตัวเหลือง ส่วนน้ำหนักต่อ 100 เมล็ดนั้น พบว่าปฏิกิริยาเริ่มมีอิทธิพลแบบทุกชนิดยกเว้นปฏิกิริยาเริ่มระหว่าง ระยะห่างในการพ่นสารเคมีกับเวลาปลูก

ผลการทดลอง พบว่า การใช้ตัวเหลือง พันธุ์สจ. 4 × copper oxychloride + zinceb + maneb × 14 วัน × 16 ชุดตุลาคม 2530 ในน้ำหนักต่อ 100 เมล็ดเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 18.42 กรัม การใช้ตัวเหลืองพันธุ์ สจ.1 × 18 กรกฎาคม 2530 ให้กำลังเฉลี่ยผลผลิตต่อไร่สูงสุด เท่ากับ 336.70 กิโลกรัม ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับพันธุ์ สจ.4 × 18 กรกฎาคม 2530 เป็นเดียวกับการใช้ copper oxychloride + zinceb + maneb × 7 วัน ให้กำลังเฉลี่ยผลผลิต ต่อไร่สูงสุดเท่ากับ 304.64 กิโลกรัม

คำนิยม

คณะกรรมการขอขอบพระคุณ ฝ่ายวิจัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ที่ได้จัดสรรงบประมาณในการทำการวิจัยจากหมวดเงินอุดหนุน งบประมาณแผ่นดิน จังหวะทั้งงานวิจัยเรื่องนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี นอกจากนี้ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วน ช่วยเหลือที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ในที่นี้ด้วย



เอกสารวิจัยอิส-

1. นิรนาม. 2526. อาจารย์ก้าพิช. สรุปผลงานวิจัยถัวเฉลียงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เสนอในการสัมมนาเชิงปฏิการเรื่องงานวิจัยถัวเฉลียง ครั้งที่ 1 ณ. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 17-18 พฤศจิกายน 2526.
2. ปริชา สุรินทร์. 2520. ปัญหาโรคถัวเฉลียงและการป้องกันในประเทศไทย. ถัวเฉลียง 2520:
รายงานการประชุมทางวิชาการเรื่องถัวเฉลียง 6 - 11 กุมภาพันธ์ 2520.
สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
3. ประพันธ์ โอลสถาพันธุ์ นิรนิตติ กิจรุ่งเรือง และ สมจิตต์ กิจรุ่งเรือง. 2529. การทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีบางชนิดต่อโรคแบคทีเรียพืชชุดของถัวเฉลียง 1) การศึกษาผลตอบแทนที่ได้รับเนื่องจาก การพ่นสารเคมี. รายงานการสัมมนาเชิงปฏิการ เรื่อง
งานวิจัยถัวเฉลียง ครั้งที่ 2 (เล่ม 2) ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2530.
ณ. โรงแรมไฟลิน จังหวัดพิษณุโลก.
4. สุคุณดี ประเทืองวงศ์ สมบูรณ์ ชูประยูร กิตติศักดิ์ อานวยกิจ และ อนงค์ เจริญกิตติวงศ์.
2528. โครงการสร้างชุดภัณฑ์ของถัวเฉลียงที่เป็นโรคใบชุดนูน. รายงานการประชุมทางวิชา
การ ครั้งที่ 24 กุมภาพันธ์ 27 - 29 มกราคม 2529. ณ. มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ บางเขน.
5. สุคุณดี ประเทืองวงศ์ อนงค์ เจริญกิตติวงศ์ เชษฐพันธ์ ชูเชื้อ กิตติศักดิ์ อานวยกิจ
สมบูรณ์ ชูประยูร และ อนรพิพัฒน์ เจิ่งเคนทร์. เปรียบเทียบความรุนแรงและลักษณะ
bacteriophage ของเชื้อ xanthomonas campestris pv. glycines
ไอโซເເເທຕ່າງໆ ในประเทศไทยและประเทศไทย. (งานวิจัยเกี่ยวกับโรคใบชุดนูน
ของถัวเฉลียงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างปี 2525 - 2529).
รายงานการสัมมนาเชิงปฏิการ เรื่องงานวิจัยถัวเฉลียง ครั้งที่ 2 (เล่ม 2) ระหว่าง
วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2530 ณ. โรงแรมไฟลิน จังหวัดพิษณุโลก.



6. สุราษฎร์ อุปคิตกุล. 2526. สถิติ : การวางแผนการทดลอง เล่ม 1. แม่สเทศการพิมพ์ กทุนเทพฯ. 435 หน้า.
7. Shanmugasundaram, S. 1979. International Cooperator's Guide : Evaluating AVRDC Soybeans (AVRDC 76-125). Asian Vegetable Research and Development Center. Sharhua, Taiwan, Republic of China.
8. Vichitrananda, S. 1975. Assessment of soybean yield loss due to bacterial pustule. Thesis for Master of Science. University of the Philippines at Los Banos.
9. Wolf, F.A. 1924. Bacterial pustule of soybean. J.Agr.Res. 29 : 57 - 68.

Source	D.F.	Mean square	
df variation		น้ำหนักต่อ 100 เม็ดค ผลผลิตต่อไร่	
		กิโลกรัม 12% (กรัม) ที่ความชื้น 12% (กิโลกรัม)	
Main-plot			
Block	3	1.716	26,454.410
พันธุ์ถัวเฉลี่ย	1	173.184 **	332.634
Error (a)	3	1.951	5,739.817
		C.V. = 9.11%	C.V. = 27.16%
Sub - plot			
+ชนิดของสารเคมี	1	9.381 **	1,987.258
+พันธุ์ถัวเฉลี่ย × ชนิดของสารเคมี	1	1.704 **	175.176
Error (b)	6	0.172	1,351.179
		C.V. = 2.70%	C.V. = 13.16%
Sub-sub-plot			
+ระยะห่างในการพ่นสารเคมี	1	0.613	1,728.395
เวลาปลูก	2	52.722 **	155,195.467 **
+ระยะห่างในการพ่นสารเคมี × เวลาปลูก 2		0.220	1,703.675
+ระยะห่างในการพ่นสารเคมี × พันธุ์ถัวเฉลี่ย 1		3.121 **	4,221.984
ระยะห่างในการพ่นสารเคมี × ชนิดของสารเคมี 4		11.888 **	21,710.539 **
เวลาปลูก × พันธุ์ถัวเฉลี่ย	2	4.876 **	20,580.999 **
+เวลาปลูก × ชนิดของสารเคมี	2	1.194 *	2,745.105
ระยะห่างในการพ่นสารเคมี × พันธุ์			
ถัวเฉลี่ย × ชนิดของสารเคมี	4	1.379 **	3,143.722
+เวลาปลูก × พันธุ์ถัวเฉลี่ย × ชนิดของสารเคมี	2	2.942 **	2,978.950
+ระยะห่างในการพ่นสารเคมี × เวลาปลูก × พันธุ์ ถัวเฉลี่ย	2	1.526 *	748.296
ระยะห่างในการพ่นสารเคมี × เวลาปลูก ×			
ชนิดของสารเคมี	8	1.256 **	1,754.311
พันธุ์ถัวเฉลี่ย × ชนิดของสารเคมี × ระยะห่าง			
ในการพ่นสารเคมี × เวลาปลูก	8	2.958 **	4,574.815
Error (c)	66	0.364	2,656.938
		C.V. = 3.93%	C.V. = 18.48%

หมายเหตุ * หมายถึง มีนัยสำคัญที่ระดับ $p < 0.05$

** หมายถึง มีนัยสำคัญที่ระดับ $p < 0.01$

* หมายถึง วิธีอิทธิพลนั้นไม่ได้รวมวิธีการไม่พ่นสารเคมี เข้าไว้ในภาระของ



รายงานพนวยที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิในอากาศ (°ช.) ความชื้นสัมพัทธ์ และปริมาณน้ำฝน (มม.) ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เมือง จ.เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2530 ถึง มกราคม 2531 ^{1/}

เดือน	อุณหภูมิ (°ช.)			ความชื้นสัมพัทธ์ (%)	ปริมาณน้ำฝน (มม.)
	ตุลาคม	ธันวาคม	มกราคม		
กรกฎาคม 2530	32.3	23.7	28.0	79	112.6
ตุลาคม 2530	31.7	24.1	27.9	85	345.6
กันยายน 2530	31.3	23.7	27.6	80	130.8
ตุลาคม 2530	31.9	22.8	27.4	77	30.8
พฤษภาคม 2530	30.7	21.7	26.2	78	74.2
ธันวาคม 2530	27.9	14.4	21.8	73	15.0
มกราคม 2531	30.0	13.9	22.0	68	0.0

1/ บันทึกเฉพาะข้อมูลในช่วงการทดลอง